



**STRIJTVEEN
WAGENAAR**



MODE D'EMPLOI
**NÉMATODES CONTRE LES VERS
BLANCS**

COMMENT RECONNAÎTRE LES VERS BLANCS

COMMENT RECONNAÎTRE UN VER BLANC

Engerlingen zijn de larven van verschillende kevers, zoals de meikever, junikever en rozenkever. Ze zijn wit, C-vormig en hebben een bruine kop met drie paar duidelijke pootjes aan de voorkant.

COMMENT RECONNAÎTRE LES DÉGÂTS

- ✓ Gazon qui se détache facilement
- ✓ Zones jaunes ou dégarnies dans le gazon
- ✓ Mauvaise croissance du gazon
- ✓ Oiseaux qui retournent le gazon

VÉRIFIEZ SI VOUS AVEZ DES VERS BLANCS

Soulevez une petite plaque de gazon avec une bêche. Si vous voyez plusieurs larves blanches, recourbées en forme de C, avec une tête brune et des pattes bien visibles, il s'agit probablement d'une infestation de vers blancs.

VOUS HÉSITEZ ENTRE LES VERS BLANCS ET LES LARVES DE TIPULES

Les vers blancs sont blancs, recourbés en forme de C et possèdent des pattes bien visibles à l'avant. Les larves de tipules sont brun grisâtre, allongées et n'ont pas de pattes visibles.



AVANT DE COMMENCER

HUMIDIFIEZ LE GAZON

Arrosez le gazon quelques heures avant le traitement. Le sol doit être humide, mais pas détrempé.

VÉRIFIEZ LA TEMPÉRATURE DU SOL

Les nématodes contre les vers blancs sont efficaces à partir d'une température du sol de 12 °C. Vérifiez la température avant de commencer.

CHOISISSEZ LE BON MOMENT

Traitez de préférence en soirée ou par temps couvert. Les nématodes risquent ainsi moins de se dessécher et se déplacent plus facilement dans le sol.

TRAITEZ TOUTE LA PELOUSE

Traitez toujours l'ensemble du gazon. Même si les dégâts ne sont visibles qu'à certains endroits, les vers blancs peuvent déjà être présents sur une plus grande surface.

RÉSULTATS ATTENDUS

Les premiers résultats sont généralement visibles après 2 à 3 semaines. En cas d'infestation importante, un deuxième traitement peut être nécessaire.



ÉTAPE 1 : MÉLANGEZ LES NÉMATODES

Mélangez tout le contenu du sachet avec 1 litre d'eau tiède. Remuez bien et laissez reposer le mélange pendant environ 15 minutes. Remuez ensuite une nouvelle fois et rincez le sachet vide avec un peu d'eau afin qu'aucun nématode ne reste dans l'emballage.

ÉTAPE 2 : DILUEZ LE MÉLANGE

Utilisez 1 litre d'eau par m² de gazon.


10 m² = 10 litres d'eau

25 m² = 25 litres d'eau

50 m² = 50 litres d'eau

100 m² = 100 litres d'eau

Remuez régulièrement pendant l'application afin que les nématodes restent répartis de manière homogène.



ÉTAPE 3 : RÉPARTISSEZ LES NÉMATODES

Répartissez le mélange uniformément sur toute la pelouse. Traitez toute la surface, même si les dégâts ne sont visibles qu'à certains endroits.

Insistez davantage sur les zones dégarnies, jaunes ou sur les endroits où le gazon se détache facilement.

Arrosez légèrement après l'application afin que les nématodes pénètrent bien dans le sol.

ÉTAPE 4 : GARDEZ LE GAZON HUMIDE

Maintenez le gazon légèrement humide pendant 5 à 7 jours après le traitement. Le sol ne doit pas être détrempé, mais il ne doit pas non plus se dessécher.

Si vous trouvez encore beaucoup de vers blancs vivants après 2 à 3 semaines ou si les dégâts continuent d'augmenter, un deuxième traitement est nécessaire.



POURQUOI LES VERS BLANCS ENDOMMAGENT LE GAZON

LES DÉGÂTS COMMENCENT AU NIVEAU DES RACINES

Les vers blancs mangent les racines du gazon. L'herbe ne peut alors plus absorber correctement l'eau et les nutriments, ce qui provoque des zones jaunes ou dégarnies.

LE GAZON SE DÉTACHE FACILEMENT

En cas de forte infestation, des plaques entières de gazon peuvent se détacher. Les racines sont alors tellement abîmées que la pelouse repose presque librement sur le sol.

LES JEUNES VERS BLANCS SONT PLUS FACILES À COMBATTRE

Les jeunes vers blancs se trouvent plus près des racines et sont plus sensibles aux nématodes. Un traitement en été ou au début de l'automne donne donc souvent les meilleurs résultats.

CONTINUEZ À SURVEILLER

Les coléoptères peuvent pondre de nouveaux œufs chaque année dans le gazon. Surveillez donc régulièrement l'apparition de nouveaux dégâts à partir de l'été.



COMMENT AGISSENT LES NÉMATODES ?

ÉTAPE 1 : À LA RECHERCHE DES VERS BLANCS

Les nématodes se déplacent dans le sol humide et recherchent les vers blancs autour des racines du gazon.

ÉTAPE 2 : PÉNÉTRATION ET ÉLIMINATION

Ze dringen de engerling binnen via natuurlijke openingen en schakelen deze van binnenuit uit.

ÉTAPE 3 : POURSUITE DE L'ACTION

Les nématodes peuvent se multiplier dans le ver blanc éliminé. Ils partent ensuite à la recherche de nouveaux vers blancs.

ÉTAPE 4 : CE QUE VOUS OBSERVEZ

Les dégâts ne cessent pas toujours immédiatement d'être visibles. Le gazon a besoin de temps pour se rétablir. Une nette amélioration est généralement visible après 2 à 3 semaines.



CYCLE DE VIE DU VER BLANC

MAI À JUILLET

Les coléoptères adultes pondent leurs œufs dans le gazon.

JUILLET À SEPTEMBRE

Les œufs éclosent et les jeunes vers blancs commencent immédiatement à se nourrir des racines du gazon.

*Il s'agit souvent de la meilleure période pour traiter.

AUTOMNE


Les vers blancs continuent de grandir et de se nourrir des racines.

HIVER

Les vers blancs passent l'hiver dans le sol. Lorsque les températures sont basses, ils s'enfoncent plus profondément dans la terre.

PRINTEMPS

Lorsque le sol se réchauffe, les vers blancs redeviennent actifs et recommencent à se nourrir des racines.



ÉVITEZ UNE NOUVELLE INFESTATION DE VERS BLANCS

RÉENSEMENCEZ LES ZONES DÉGARNIES

Une fois les vers blancs éliminés, ressemez les zones dégarnies. Cela permettra au gazon de se rétablir plus rapidement.

TONDEZ RÉGULIÈREMENT

Un gazon dense et en bonne santé résiste mieux aux dégâts et est moins attractif pour les coléoptères qui souhaitent pondre leurs œufs.

AÉREZ LE GAZON

Un sol bien aéré favorise un bon développement des racines et améliore l'évacuation de l'excès d'eau.

CONTRÔLEZ RÉGULIÈREMENT VOTRE GAZON

À partir de l'été, vérifiez régulièrement la présence de zones dégarnies, de gazon qui se détache facilement ou d'oiseaux qui fouillent la pelouse. Plus une infestation est détectée tôt, plus elle est facile à traiter.



QUESTIONS FRÉQUENTES

QUAND LES PREMIERS RÉSULTATS SONT-ILS VISIBLES ?

Une nette amélioration est généralement visible après 2 à 3 semaines. Le gazon ne se rétablit pas immédiatement, car les racines endommagées ont besoin de temps pour repousser.

JE VOIS ENCORE DES VERS BLANCS. EST-CE NORMAL ?

Oui, en cas de forte infestation. Tous les vers blancs ne sont pas atteints en même temps. Répétez le traitement si vous trouvez encore beaucoup de vers blancs vivants après 2 à 3 semaines.

PUIS-JE RESSEMER DU GAZON ?

Oui. Ressemez les zones dégarnies dès que les vers blancs ont été combattus. Maintenez ensuite le sol légèrement humide.

LES NÉMATODES AGISSENT-ILS AUSSI CONTRE LES COLÉOPTÈRES ADULTES ?

Non. Les nématodes agissent contre les larves présentes dans le sol : les vers blancs. Les coléoptères adultes ne sont pas combattus.

